



## Indicaciones examen Scanner/Tomografía Computarizada (TAC)

### Sin medio de contraste

- Traer orden médica.
- Traer exámenes anteriores.
- Asistir sin objetos metálicos, joyas ni objetos de valor
- Este examen está contraindicado en embarazadas.
- Scanner de Pielotac, requiere retener orina al momento de tomar el examen, se recomienda tomar abundante líquido al menos 1 hora antes.

### Con medio de contraste (adicional a lo anterior)

- Debe tener 4 horas de ayuno.
- Deben tomarse el examen de creatinina a los siguientes pacientes: Mayores de 60 años, Con antecedentes de enfermedad renal, Hipertensos, Diabéticos, Resistencia a la insulina, Monorreno, Lupus, Insuficiencia cardíaca descompensada, Mieloma múltiple y Miastenia gravis.  
**La vigencia de la Creatinina es de máximo 30 días** desde la toma de muestra y resultado en rangos normales. Con Creatinina fuera de Rango solo se administra medio de contraste previa autorización por escrito del médico tratante.  
Si el paciente se realizó examen con contraste reciente debe traer una creatinina actualizada posterior a la última inyección de contraste.  
**Pacientes que tomen metformina**, deben traer examen de creatinina actualizado y suspender la metformina 2 días antes y 2 días después del examen, suspensión previa consulta con su médico tratante.
- Pacientes con insuficiencia renal que se dializan, se debe coordinar el TAC previo a diálisis y con autorización por escrito del médico tratante.
- Se deben premedicar pacientes Asmáticos y con alergias a medicamentos, ambiental y/o alimentos y la puede solicitar en el servicio de imagenología un día antes.
- El examen con medio de contraste está contraindicado en pacientes menores de 1 año, en el embarazo y pacientes con hipertiroidismo.